

Übungen zur Vorlesung Logik  
Blatt 9

Prof. Dr. Klaus Madlener

Abgabe bis 29. Juni 2011 10:00 Uhr

**1. Aufgabe:** [Allgemeingültigkeit, Übung]

Zeigen Sie, dass die folgenden Formeln allgemeingültig sind:

$$A_1 \equiv (a = 3 \rightarrow (q \rightarrow \forall y[a = y \rightarrow y = 4])) \rightarrow ((a = 3 \rightarrow q) \rightarrow (a = 3 \rightarrow \forall y[a = y \rightarrow y = 4]))$$

$$A_2 \equiv \forall z \forall x [p(x)] \rightarrow p(f(a, 5))$$

$$A_3 \equiv \exists P \forall Q [P \rightarrow (Q \wedge r) \rightarrow P \vee r]$$

$$A_4 \equiv \exists P [P]$$

**2. Aufgabe:** [Substitution, Übung]

1. Finden Sie eine Formel  $A$ , einen Term  $t$  und eine Individuenvariable  $x$ , so dass die Substitution  $A_x[t]$  erlaubt ist,  $A_x[t]$  allgemeingültig ist, aber  $A$  nicht allgemeingültig ist.
2. Gegeben sei die Substitution  $\sigma$  aus Aufgabe 5. Wenden Sie diese Substitution auf die folgenden Terme und Formeln an:

$$A_1 \equiv (x < 3 \rightarrow p(x_1))$$

$$A_2 \equiv \exists x [x = 0 \vee P(x_3)]$$

$$A_3 \equiv \forall x [\neg x_1 = 0]$$

$$A_4 \equiv \forall x_1 [\neg x_1 = 0] \rightarrow p$$

**3. Aufgabe:** [Semantische Folgerung, Übung]Es sei  $A \in \text{Form}$ . Zeigen oder widerlegen Sie:

1.  $\exists y \forall x A \models \forall x \exists y A$
2.  $\forall x \exists y A \models \exists y \forall x A$
3.  $\forall x f(x) = g(x) \models f = g$ .

**4. Aufgabe:** [Tautologien in PL, 5P]

Zeigen Sie, dass die folgenden Formeln allgemeingültig sind:

$$A_1 \equiv \forall x \exists P [P(x) \vee x = f(a)] \rightarrow (Q(y, z) \rightarrow \forall x \exists P [P(x) \vee x = f(a)])$$

$$A_2 \equiv \forall x [q(x)] \rightarrow q(h(g(a, f(b)), b, f(c)))$$

$$A_3 \equiv \forall z [\neg(x = f(x) \rightarrow p(f(x))) \rightarrow (p(f(x)) \rightarrow x = f(x))]$$

$$A_4 \equiv \exists P [P \rightarrow q \vee r]$$

**5. Aufgabe:** [Substitution, 10 P]

Die Substitution  $\sigma$  sei durch

$$\sigma(x_1) = x + 3 \cdot x$$

$$\sigma(x_2) = 3 - (x + x_1) \cdot 2$$

$$\sigma(x_3) = 42$$

$$\sigma(x_4) = f(a, g(b))$$

$$\sigma(x_5) = \text{if } (x > 3) \text{ then } 5 \text{ else } 3$$

$$\sigma(x_6) = g(y * 2)$$

gegeben. Wenden Sie  $\sigma$  auf die folgenden Formeln an. Geben Sie jeweils mit an, ob die Substitution erlaubt ist.

$$A_1 \equiv x_1 \geq x_3$$

$$A_2 \equiv \forall x[x = 42 \rightarrow \neg(x_4 = 3)]$$

$$A_3 \equiv \exists y[f(y) = 0 \rightarrow \forall x[x \geq x_2]]$$

$$A_4 \equiv p(x_1) \vee \forall x[x + 3 > x_6]$$

$$A_5 \equiv \forall x[x_5 = 5 \rightarrow x > 3]$$

$$A_6 \equiv x_3 < x_4 \vee \forall y[p(y) \vee y = 3]$$

$$A_7 \equiv \forall x_3[x_3 = 42]$$

**6. Aufgabe:** [Entscheidbarkeit der Gleichheitslogik, 5P]

In der Vorlesung wurde gezeigt, dass die Allgemeingültigkeit von Formeln im Allgemeinen unentscheidbar ist. Dies gilt jedoch nicht für alle eingeschränkten Formelklassen. Betrachten Sie Formeln der *reinen Gleichheitslogik*, d.h. Formeln in den Operatoren  $\{\neg, \wedge, \vee, \forall, \exists\}$ , die nur Individuenvariablen „ $x_i$ “ und „ $=$ “ enthalten. Ein Beispiel wäre also

$$\forall x \forall y \exists z [(x = y \wedge y \neq z) \rightarrow x = z].$$

Skizzieren Sie ein Verfahren, das entscheidet, ob eine solche Formel allgemeingültig ist, oder nicht. Begründen Sie die Korrektheit Ihres Verfahrens.

**Abgabe: bis 29. Juni 2011 10:00 Uhr im Kasten neben Raum 34-401.4**